

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.



IMPfung	ALTER	(in Wochen)	Säuglinge			(in Monaten)	Kleinkinder		Kinder			(in Jahren)	Jugendliche		Erwachsene	
		6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60	
		U4			U6		U7/8			U9		U10		J1		
Rotaviren		G1 <sup>a</sup>	G2	(G3)												
Tetanus			G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N	A (ggf. N) <sup>f</sup>			
Diphtherie			G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N	A (ggf. N) <sup>f</sup>			
Keuchhusten Pertussis			G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N	A3 <sup>f</sup>	ggf. N		
Hib <i>Haemophilus influenzae</i> Typ b			G1	G2 <sup>b</sup>	G3	G4	N									
Kinderlähmung Poliomyelitis			G1	G2 <sup>b</sup>	G3	G4	N			A1	N	ggf. N				
Hepatitis B			G1	G2 <sup>b</sup>	G3	G4	N									
Pneumokokken <sup>c</sup>			G1		G2	G3	N									
Meningokokken C							G1 (ab 12 Monaten)		N							
Masern							G1	G2	N			S <sup>e</sup>				
Mumps, Röteln							G1	G2	N							
Windpocken Varizellen							G1	G2	N							
HPV Humane Papillomviren									G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>	N <sup>d</sup>					
Herpes zoster													G1 <sup>h</sup>	G2 <sup>h</sup>		
Grippe Influenza													S (jährlich)			

Nächste Impftermine



### ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)
- S** STANDARDIMPfung
- A** AUFFRISCHIMPfung
- N** NACHHOLIMPfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- b** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- c** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.
- d** Standardimpfung für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 – 14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

- e** Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
- f** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- g** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
- h** Zweimalige Impfung mit adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten