

Impfkalender der Öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen in M-V

(Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V, Abt. Gesundheit: Stand Januar 2014)

Impfung gegen	Alter in Wochen	Alter in Monaten					Alter in Jahren			
	6	2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-17	ab 18	≥ 60
Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Hib, Poliomyelitis, Hepatitis B (HB)		1.	2.	3.	4.	← Nachholimpfungen (HB) ^A →				
Pneumokokken		1.	2.	3.	4.	↔				S
Rotaviren	1.	2.	(3.) ^B							
Meningokokken, Typ B ^C		1.	2.	3.	4.	← Nachholimpfungen ^A →				
Meningokokken, Typ C (ggf. Typ A/C/W135/Y) ^D					1. (ab 12 Monaten)		← Nachholimpfungen ^A →			
Tetanus, Diphtherie, Pertussis (Tdap bzw. Tdap)							A			
Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Poliomyelitis (Tdap-IPV)								A		
Masern, Mumps, Röteln (MMR)					1.	2. ^E	← Nachholimpfungen ^A →		Masern ^F	
Varizellen					1.	2. ^E	← Nachholimpfungen ^A →			
Humane Papillomviren (HPV)								12- 17 J. Mädchen (3x)		
Influenza (jährlich)										S
Tetanus, Diphtherie, Pertussis										A ^G

A Nachholen bzw. Vervollständigen des Impfschutzes bis zum 18. Geburtstag

B Je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mind. 4 Wochen erforderlich

C Noch keine STIKO-Empfehlung, in M-V empfohlen. Finanzierung bisher nur durch AOK-Nordost als Satzungsleistung

D Herstellerhinweise zur Altersbegrenzung beachten

E 2. Impfung kann auch mit MMRV-Impfstoff erfolgen

F Nach 1970 Geborene ≥ 18 Jahre → 1 Impfung für Ungeimpfte, in der Kindheit 1x Geimpfte, Personen für unklarem Impfstatus (vorzugsweise MMR-Impfstoff)

G Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre; nächste fällige Td einmal als Tdap (Tdap) oder Tdap-IPV

S = Standardimpfung

A = Auffrischimpfung